

ERAS-PROTOCOL HEMICOLECTOMIE

Alle patiënten waarbij een deel van het colon wordt verwijderd komen in aanmerking voor het ERAS protocol **tenzij anders vermeld door de chirurg**

VOORBEREIDING OP DE OPERATIE



NUCHTERBELEID
vanaf 24u middernacht



DARMVOORBEREIDING
Afhankelijk van ingreep



CLIPPEREN
Op de afdeling

EDUCATIE VAN DE PATIËNT



	OPNAME	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4		
VOEDING							
PINSTELLING							
ACTIVITEITEN							

VERLOOP NA DE OPERATIE

	D-1	D0	D1	D2	D3	D4	D5
PERIFEER INFUUS		1,5 L/24u	1,5L/24u	slotje	slotje	slotje	slotje
MAAGSONDE		Postop uithalen					
PIJN		Paracetamol IV/6u Tradonal 100mg + litican 50mg/8u Dipidolor ZN	Paracetamol IV/6u Tradonal 100mg + litican 50mg/8u Dipidolor ZN	Paracetamol PO/6u tradonal odis ZN	Paracetamol PO/6u tradonal odis ZN	Paracetamol PO/6u tradonal odis ZN	Paracetamol PO/6u tradonal odis ZN
VOEDING	24u: nuchter	<u>Dun vloeibaar:</u> Water Waterijsjes	Thee Toast - Confituur Yoghurt	MDSP GR2* Advies diëtist	MDSP GR3**	MDSP GR3**	MDSP GR3**
*Licht verteerbare voeding zonder groenten en fruit // **licht verteerbare voeding							
UITSCHIEDING	Darmvoorbereiding	MS uit op recovery Blake uit bij flatus	Blake uit bij flatus	Blake uit bij flatus	Blake uit bij flatus	Blake uit bij flatus	Redon uit D5
MOBILISATIE		Avond na operatie op rand vh bed zitten	3x opzitten wandelen AH-kiné	3x opzitten wandelen AH-kiné	zelfstandig wandelen	zelfstandig wandelen	zelfstandig wandelen
BANDAGE		Buikband	buikband	buikband	buikband	Abdominal actimove	Abdominal actimove
THROMBOSE- PROFYLAXE	20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg	TED-kousen 20u: Clexane 40mg
MAAGPROTECTIE		8u: Pantomed 40mg	8u: Pantomed 40mg	8u: Pantomed 40mg	8u: Pantomed 40mg	8u: Pantomed 40mg	8u: Pantomed 40mg